

El zika y las relaciones sexuales: Información para las mujeres embarazadas que viven en áreas con zika



Qué sabemos

- ◆ El virus del Zika puede transmitirse de un hombre que padezca la enfermedad a sus parejas sexuales.
- ◆ En casos conocidos de transmisión sexual, los hombres presentaron síntomas del virus del Zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que estos desaparecen.
- ◆ El virus puede estar presente en el semen por más tiempo que en la sangre.



Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo puede permanecer el virus en el semen del hombre que haya padecido el zika.
- ◆ Si los hombres infectados que nunca presentaron síntomas pueden tener el virus del Zika en el semen.
- ◆ Si los hombres que nunca presentaron síntomas pueden transmitir el zika.
- ◆ Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Debido a la relación que existe entre el zika y los defectos congénitos, **tome medidas para evitar la infección durante el embarazo.**

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene), use condón correctamente en cada ocasión, durante el embarazo de su pareja.



No mantenga relaciones sexuales con su pareja masculina durante el embarazo.



Si piensa que su pareja masculina puede tener o ha tenido zika, informe a su proveedor de atención médica

- ◆ Si ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- ◆ Si tuvo relaciones sexuales sin condón.