

الرقم التعريفي للتفشي:
الرقم التعريفي للحمى الفيروسية النزفية:
الرقم التعريفي للمختبر:

استمارة الفحص

بشأن النقل المحتمل للإيبولا عن طريق التواصل الجنسي إلى شريك شخص ناج من الإيبولا

ملاحظة: سيتم استخدام هذه الاستمارة لتحديد ما إذا كانت الأدلة الوبائية موجودة في دعم انتقال مرض فيروس الإيبولا من ناج إلى شريكه الجنسي بعد الشفاء من إصابة شديدة بالإيبولا. في هذه الاستمارة، "الحالة" هي حالة الإيبولا الجديدة التي يُشكك في انتقال الفيروس إليها عن طريق الاتصال الجنسي.

الرقم التعريفي للحالة: _____	تاريخ تقرير الحالة: _____ / _____ / _____
هل تم تأكيد الحالة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	في حال أجبت بلا، توقف
1. هل حدث أي احتكاك جنسي (مهبطي أو فموي أو شرجي) بين الحالة المصابة بالإيبولا والناجي من الإيبولا منذ خروج الناجي من وحدة معالجة الإيبولا؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> غير معروف
في حال أجبت بلا أو بغير معروف، توقف وضع علامة على "لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة" في الصفحة 3 (تصنيف الانتقال)	
في حال أجبت بنعم، هل تم استخدام واقٍ ذكري؟	<input type="checkbox"/> في كل مرة <input type="checkbox"/> أحياناً <input type="checkbox"/> أبداً
ما هو الرقم التعريفي لحالة الناجي؟	
2. هل تمت متابعة الحالة كجهة اتصال مع الناجي المذكور أعلاه؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> غير معروف
3. هل تعاني الحالة من عوامل ومخاطر وبائية محددة على استمارة الفحص بحالة إصابة بالإيبولا؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
في حال أجبت بلا، قم بالتأكد من خلال السؤال مجدداً عن عوامل المخاطرة على استمارة الفحص الخاصة بالحالة	

الرجاء إدخال التواريخ التالية بأدق شكل ممكن. الأحرف المحددة لكل تاريخ (أ، ب، ج، د) ستسهّل من عمليات حساب الفروقات الزمنية. بعد إدخال التاريخ، استخدم الجدول في الصفحة 2 لتحديد أي يوم من السنة، وأدخل هذا الرقم إلى يمين التاريخ (عمود اليوم من السنة).
اليوم من السنة*

أ. تاريخ بدء الأعراض عند الحالة	= أ	_____ / _____ / _____ شهر يوم سنة
ب. تاريخ الاحتكاك الأخير (أي احتكاك) مع الناجي فيما كان الناجي يظهر الأعراض وقبل إدخال الناجي إلى وحدة علاج الإيبولا	= ب	_____ / _____ / _____ شهر يوم سنة
ج. تاريخ آخر (أحدث) احتكاك جنسي مع الناجي بعد إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا	= ج	_____ / _____ / _____ شهر يوم سنة
د. تاريخ إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا	= د	_____ / _____ / _____ شهر يوم سنة

يحدد الجدول التالي رقماً لكل يوم من السنة ويمكن استخدامه لاحتساب الفارق بين تاريخ وآخر، وبخاصة إذا كان التاريخان في شهرين مختلفين. لاستخدام الجدول، قم بالبحث عن الشهر في الصف الأعلى والبحث عن أي يوم من الشهر في العمود الأيسر الأقصى. ثم ابحث عن النقطة التي يلتقي فيها الشهر واليوم.

في المثال المحدد أدناه، 23 أغسطس هو اليوم الـ 235 من السنة و1 أكتوبر هو اليوم الـ 274. إذا كان 1 أكتوبر تاريخ بدء الأعراض و23 أغسطس تاريخ آخر احتكاك جنسي، يكون الفارق (235-274) أو 39 يوماً.

الشهر

اليوم	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
1	1	32	60	91	121	152	182	213	244	274	305	335
2	2	33	61	92	122	153	183	214	245	275	306	336
3	3	34	62	93	123	154	184	215	246	276	307	337
4	4	35	63	94	124	155	185	216	247	277	308	338
5	5	36	64	95	125	156	186	217	248	278	309	339
6	6	37	65	96	126	157	187	218	249	279	310	340
7	7	38	66	97	127	158	188	219	250	280	311	341
8	8	39	67	98	128	159	189	220	251	281	312	342
9	9	40	68	99	129	160	190	221	252	282	313	343
10	10	41	69	100	130	161	191	222	253	283	314	344
11	11	42	70	101	131	162	192	223	254	284	315	345
12	12	43	71	102	132	163	193	224	255	285	316	346
13	13	44	72	103	133	164	194	225	256	286	317	347
14	14	45	73	104	134	165	195	226	257	287	318	348
15	15	46	74	105	135	166	196	227	258	288	319	349
16	16	47	75	106	136	167	197	228	259	289	320	350
17	17	48	76	107	137	168	198	229	260	290	321	351
18	18	49	77	108	138	169	199	230	261	291	322	352
19	19	50	78	109	139	170	200	231	262	292	323	353
20	20	51	79	110	140	171	201	232	263	293	324	354
21	21	52	80	111	141	172	202	233	264	294	325	355
22	22	53	81	112	142	173	203	234	265	295	326	356
23	23	54	82	113	143	174	204	235	266	296	327	357
24	24	55	83	114	144	175	205	236	267	297	328	358
25	25	56	84	115	145	176	206	237	268	298	329	359
26	26	57	85	116	146	177	207	238	269	299	330	360
27	27	58	86	117	147	178	208	239	270	300	331	361
28	28	59	87	118	148	179	209	240	271	301	332	362
29	29	29	88	119	149	180	210	241	272	302	333	363
30	30	30	89	120	150	181	211	242	273	303	334	364
31	31	31	90		151		212	243		304		365

باستعمال أيام السنة المرتبطة بالتواريخ على الصفحة *1، قم باحتساب الفواصل الزمنية التالية بحسب عدد الأيام، استناداً إلى المعادلات المبيّنة:

الوقت بين الاحتكاك الأخير من أي نوع فيما كان الناجي مصاباً بالإيولا الشديد وبداية أعراض الحالة: (أ - ب) =
 الفارق بين الاحتكاك الجنسي الأخير قبل بدء أعراض الحالة: (أ - ج) =
 قم بالإجابة على الأسئلة التالية بناءً على الحسابات أعلاه:

1. هل (أ - ب) يساوي أو أكبر من 21؟
 2. هل (أ - ج) أقل من 2 والاحتكاك الجنسي الوحيد؟
 3. هل (أ - ج) يساوي أو أقل من 21؟
- قم بالإجابة على الأسئلة التالية بشأن الحالة:

4. هل أقامت الحالة في منطقة مع حالات إيولا أخرى في الأيام الـ 21 التي سبقت بداية الأعراض؟
5. هل سافرت الحالة إلى منطقة فيها انتقال قائم للإيولا في خلال الأيام 2-21 قبل بداية الأعراض؟

استخدم الجدول أدناه لتحديد تصنيف الخطر، استناداً إلى الإجابات على الأسئلة 1-5 أعلاه:

السؤال 1	السؤال 2	السؤال 3	السؤال 4	السؤال 5	تصنيف الخطر
نعم	لا	نعم	نعم	لا	احتمال نقل الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا
نعم	لا	نعم	لا	نعم	احتمال نقل الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا
نعم	لا	نعم	لا	لا	احتمال نقل المحتمل للإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا
	نعم	لا			لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة/من غير المحتمل أن تكون الإصابة بسبب التعرض الجنسي مع الناجي
لا					هناك احتمالية للتعرض للناجي في خلال فترة المرض الشديدة في خلال فترة الحضانة

تصنيف الانتقال (ضع علامة على إجابة واحدة)

احتمالية انتقال الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا □
 في مجتمع يشهد انتقالاً مستمراً لفيروس الإيولا، فإن الانتقال الجنسي الممكن لفيروس الإيولا هو عندما يعاني شريك جنسي لناج من الإيولا من عدوى إيولا مؤكدة مع بداية أعراض بعد أكثر من يومين على ممارسة الجنس مع الناجي، وبعد أكثر من 21 يوماً بعد آخر احتكاك مع الناجي عندما كان يعاني من مرض الإيولا الحاد، ولا يمكن أن يستبعد إجراء مزيد من عمليات الفحص بشأن تواريخ السفر وجهات الاتصال المجتمعية للشريك الجنسي مصادر أخرى محتملة من التعرض للإيولا

احتمال انتقال الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا □
 في مجتمع لا يشهد انتقالاً مستمراً لفيروس الإيولا، فإن الانتقال الجنسي المحتمل لفيروس الإيولا هو عندما يعاني شريك جنسي لناج من الإيولا من عدوى إيولا مؤكدة مع بداية أعراض بعد أكثر من يومين على ممارسة الجنس مع الناجي، وبعد أكثر من 21 يوماً بعد آخر احتكاك مع الناجي عندما كان يعاني من مرض الإيولا الحاد، ولم يحدد إجراء مزيد من التحقيقات بشأن تواريخ السفر وجهات الاتصال المجتمعية للشريك الجنسي أي مصادر أخرى محتملة من التعرض للإيولا

لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة □

هناك إمكانية التعرض للناجي في خلال فترة المرض الشديدة في خلال فترة الحضانة □

تعليقات إضافية:

تقييم الاحتكاك الجنسي في خلال فترة تعافي الناجي استناداً إلى الإجابات في الصفحة 1
1. الفاصل الزمني بين آخر (أحدث) احتكاك جنسي مع الناجي بعد إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا

(ج - د) = _____
هل (ج - د) يساوي أو أقل من 90 يوماً؟ نعم لا في حال أجبت بلا، يكون (ج - د) أكبر من 90 يوماً.