

الرقم التعريفي للتفشي:
الرقم التعريفي للحمى الفيروسية النزفية:
الرقم التعريفي للمختبر:

استمارة الفحص

بشأن النقل المحتمل للإيبولا عن طريق التواصل الجنسي إلى شريك شخص ناج من الإيبولا

ملاحظة: سيتم استخدام هذه الاستمارة لتحديد ما إذا كانت الأدلة الوبائية موجودة في دعم انتقال مرض فيروس الإيبولا من ناج إلى شريكه الجنسي بعد الشفاء من إصابة شديدة بالإيبولا. في هذه الاستمارة، "الحالة" هي حالة الإيبولا الجديدة التي يُشكك في انتقال الفيروس إليها عن طريق الاتصال الجنسي.

| | |
|--|--|
| الرقم التعريفي للحالة: _____ | تاريخ تقرير الحالة: _____ / _____ / _____ |
| هل تم تأكيد الحالة؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا | في حال أجبت بلا، توقف |
| 1. هل حدث أي احتكاك جنسي (مهبطي أو فموي أو شرجي) بين الحالة المصابة بالإيبولا والناجي من الإيبولا منذ خروج الناجي من وحدة معالجة الإيبولا؟ | <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> غير معروف |
| في حال أجبت بلا أو بغير معروف، توقف وضع علامة على "لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة" في الصفحة 3 (تصنيف الانتقال) | |
| في حال أجبت بنعم، هل تم استخدام واقٍ ذكري؟ | <input type="checkbox"/> في كل مرة <input type="checkbox"/> أحياناً <input type="checkbox"/> أبداً |
| ما هو الرقم التعريفي لحالة الناجي؟ | |
| 2. هل تمت متابعة الحالة كجهة اتصال مع الناجي المذكور أعلاه؟ | <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> غير معروف |
| 3. هل تعاني الحالة من عوامل ومخاطر وبائية محددة على استمارة الفحص بحالة إصابة بالإيبولا؟ | <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا |
| في حال أجبت بلا، قم بالتأكد من خلال السؤال مجدداً عن عوامل المخاطرة على استمارة الفحص الخاصة بالحالة | |

الرجاء إدخال التواريخ التالية بأدق شكل ممكن. الأحرف المحددة لكل تاريخ (أ، ب، ج، د) ستسهّل من عمليات حساب الفروقات الزمنية. بعد إدخال التاريخ، استخدم الجدول في الصفحة 2 لتحديد أي يوم من السنة، وأدخل هذا الرقم إلى يمين التاريخ (عمود اليوم من السنة).

| | | |
|--|-----|--------------------------------------|
| أ. تاريخ بدء الأعراض عند الحالة | = أ | _____ / _____ / _____ شهر يوم سنة |
| ب. تاريخ الاحتكاك الأخير (أي احتكاك) مع الناجي فيما كان الناجي يظهر الأعراض وقبل إدخال الناجي إلى وحدة علاج الإيبولا | = ب | _____ / _____ / _____ شهر يوم سنة |
| ج. تاريخ آخر (أحدث) احتكاك جنسي مع الناجي بعد إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا | = ج | _____ / _____ / _____ شهر يوم سنة |
| د. تاريخ إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا | = د | _____ / _____ / _____ شهر يوم سنة |

يحدد الجدول التالي رقماً لكل يوم من السنة ويمكن استخدامه لاحتساب الفارق بين تاريخ وآخر، وبخاصة إذا كان التاريخان في شهرين مختلفين. لاستخدام الجدول، قم بالبحث عن الشهر في الصف الأعلى والبحث عن أي يوم من الشهر في العمود الأيسر الأقصى. ثم ابحث عن النقطة التي يلتقي فيها الشهر واليوم.

في المثال المحدد أدناه، 23 أغسطس هو اليوم الـ 235 من السنة و1 أكتوبر هو اليوم الـ 274. إذا كان 1 أكتوبر تاريخ بدء الأعراض و23 أغسطس تاريخ آخر احتكاك جنسي، يكون الفارق (235-274) أو 39 يوماً.

الشهر

| اليوم | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 29 | 29 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | 30 | 30 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 31 | 31 | 31 | 90 | | 151 | | 212 | 243 | | 304 | | 365 |

باستعمال أيام السنة المرتبطة بالتواريخ على الصفحة *1، قم باحتساب الفواصل الزمنية التالية بحسب عدد الأيام، استناداً إلى المعادلات المبيّنة:

الوقت بين الاحتكاك الأخير من أي نوع فيما كان الناجي مصاباً بالإيولا الشديد وبداية أعراض الحالة: (أ - ب) =
 الفارق بين الاحتكاك الجنسي الأخير قبل بدء أعراض الحالة: (أ - ج) =
 قم بالإجابة على الأسئلة التالية بناءً على الحسابات أعلاه:

1. هل (أ - ب) يساوي أو أكبر من 21؟
 2. هل (أ - ج) أقل من 2 والاحتكاك الجنسي الوحيد؟
 3. هل (أ - ج) يساوي أو أقل من 21؟
- قم بالإجابة على الأسئلة التالية بشأن الحالة:

4. هل أقامت الحالة في منطقة مع حالات إيولا أخرى في الأيام الـ 21 التي سبقت بداية الأعراض؟
5. هل سافرت الحالة إلى منطقة فيها انتقال قائم للإيولا في خلال الأيام 2-21 قبل بداية الأعراض؟

استخدم الجدول أدناه لتحديد تصنيف الخطر، استناداً إلى الإجابات على الأسئلة 1-5 أعلاه:

| السؤال 1 | السؤال 2 | السؤال 3 | السؤال 4 | السؤال 5 | تصنيف الخطر |
|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| نعم | لا | نعم | نعم | لا | احتمال نقل الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا |
| نعم | لا | نعم | لا | نعم | احتمال نقل الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا |
| نعم | لا | نعم | لا | لا | احتمال نقل المحتمل للإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا |
| | نعم | لا | | | لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة/من غير المحتمل أن تكون الإصابة بسبب التعرض الجنسي مع الناجي |
| لا | | | | | هناك احتمالية للتعرض للناجي في خلال فترة المرض الشديدة في خلال فترة الحضانة |

تصنيف الانتقال (ضع علامة على إجابة واحدة)

احتمالية انتقال الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا □
 في مجتمع يشهد انتقالاً مستمراً لفيروس الإيولا، فإن الانتقال الجنسي الممكن لفيروس الإيولا هو عندما يعاني شريك جنسي لناج من الإيولا من عدوى إيولا مؤكدة مع بداية أعراض بعد أكثر من يومين على ممارسة الجنس مع الناجي، وبعد أكثر من 21 يوماً بعد آخر احتكاك مع الناجي عندما كان يعاني من مرض الإيولا الحاد، ولا يمكن أن يستبعد إجراء مزيد من عمليات الفحص بشأن تواريخ السفر وجهات الاتصال المجتمعية للشريك الجنسي مصادر أخرى محتملة من التعرض للإيولا

احتمال انتقال الإيولا عن طريق التواصل الجنسي من شخص نجا من الإيولا □
 في مجتمع لا يشهد انتقالاً مستمراً لفيروس الإيولا، فإن الانتقال الجنسي المحتمل لفيروس الإيولا هو عندما يعاني شريك جنسي لناج من الإيولا من عدوى إيولا مؤكدة مع بداية أعراض بعد أكثر من يومين على ممارسة الجنس مع الناجي، وبعد أكثر من 21 يوماً بعد آخر احتكاك مع الناجي عندما كان يعاني من مرض الإيولا الحاد، ولم يحدد إجراء مزيد من التحقيقات بشأن تواريخ السفر وجهات الاتصال المجتمعية للشريك الجنسي أي مصادر أخرى محتملة من التعرض للإيولا

لا دليل على تعرض جنسي في خلال فترة الحضانة □

هناك إمكانية التعرض للناجي في خلال فترة المرض الشديدة في خلال فترة الحضانة □

تعليقات إضافية:

تقييم الاحتكاك الجنسي في خلال فترة تعافي الناجي استناداً إلى الإجابات في الصفحة 1
1. الفاصل الزمني بين آخر (أحدث) احتكاك جنسي مع الناجي بعد إخراج الناجي من وحدة علاج الإيبولا

(ج - د) = _____
هل (ج - د) يساوي أو أقل من 90 يوماً؟
 نعم لا في حال أجبت بلا، يكون (ج - د) أكبر من 90 يوماً.